



















Psicomautas



Alberto Vázquez














**Composición**

Clorhidrato de Perfezaina, Amitriptilina

Indicaciones

Ansiedad grave, agitación crónica y leves síntomas esquizoides.

Posología

Variable. Debe ajustarse de acuerdo a la severidad de la afección y a la respuesta obtenida.


Contraindicaciones

Pacientes comatosos, lesión hepática o depresión de la médula ósea.

Efectos secundarios

Elevación de la presión arterial, arritmias y leves dolores intramusculares.

Tan solo bajo el efecto de sustancias te sientes completamente feliz y olvidas todos tus miedos...



...Preparado...



...listo...



¡Hoy has realizado un gran salto!




No te arriesgues... sólo es una cuestión de confianza en ti mismo






... Concéntrate...




Vuela bajo... no te precipites...



...En momentos como estos sientes una especial empatía con todo lo que te rodea...



Presta atención... ese picado es muy difícil




¡¡Cuidado Birdboy!! Otra vez has vuelto a perder el control










A este paso nunca
lo lograrás









¿O no recuerdas lo que
dice la gente sobre ti?



















Composición
Maleinato ácido de nomifensin (DCI)

Indicaciones
Trastornos depresivos con indiferencia, apatía.
Molestias somáticas.

Posología
En casos normales/severos se recomiendan
dosis de 100-200 mg al día. En depresiones de
mayor gravedad puede aumentarse hasta un
máximo de 300mg/día.

Contraindicaciones
No existe experiencia en niños menores de
6 años.

Intoxicación y tratamiento
Inquietud, insomnio, náuseas, ojos rojizos, que
desaparecen sin interrumpir la medicación.



